

CALENDARIO COMÚN DE VACUNACIÓN

	Prenatal	0 meses	2 meses	4 meses	6 meses	11 meses	12 meses	15 meses	3-4 años	5 años	6 años	12 años	14 años	15-18 años	19-64 años	>65 años
																
Poliomielitis			VPI	VPI		VPI					VPI*					
Difteria, Tétanos, Tos Ferina	dTPa		dTPa	dTPa		dTPa					dTPa*		Td	Td		Td
Haemophilus Influenzae b			Hib	Hib		Hib										
Hepatitis B		HB	HB	HB		HB	HB*									
Enfermedad Neumocócica			VNC	VNC		VNC										VNC
Rotavirus			RV													
Enfermedad Meningocócica			MenB	MenB MenC		MenB MenC						MenACWY	MenACWY			
Sarampión, Rubeola, Parotiditis						TV/SRP		TV/SRP	TV/SRP	TV/SRP						
Varicela								VAR	VAR	VAR						
Virus Papiloma Humano												VPH	VPH			
Herpes Zóster																HZ
Gripe	GRYPE				GRYPE											GRYPE
Covid-19	COVID19															COVID19
Virus Respiratorio Sincitial		VRS														

Color Opaco = Vacunación Sistemática (aplicable a todos los colores)

Color Translúcido = Vacunación en personas susceptibles o no vacunadas (aplicable a todos los colores)

Poliomielitis

VPI = Poliomielitis inyectable

- Vacunación a los 2, 4, 11 meses (DTPa + VPI + Hib + HB)
- Vacunación a los 6 años:
 - DTPa + VPI: para los menores vacunados a los 2, 4 y 11 meses.
 - Los vacunados a los 2, 4, 6 y 18 meses (4 dosis en total) recibirán una dosis de dTpa sin VPI.

Difteria, Tétanos, Tos Ferina

DTPa = Difteria-Tétanos-Tosferina Acelular

Tdpa = Tétanos-difteria-tosferina acelular de baja carga antigénica

Td = Tétanos-difteria de baja carga antigénica

- Prenatal (dTpa): 1 dosis en cada embarazo entre las semanas 27 o 28.
- Vacunación a los 2, 4, 11 meses (DTPa + VPI + Hib + HB)
- Vacunación a los 6 años:
 - DTPa + VPI: para los menores vacunados a los 2, 4 y 11 meses.
 - Los vacunados a los 2, 4, 6 y 18 meses (4 dosis en total) recibirán una dosis de dTpa sin VPI.
- Vacunación en personas adultas (Td): Verificar el estado de vacunación previo antes de iniciar o completar una pauta de primovacación. En caso necesario, se vacunará con Td hasta completar 5 dosis. Se administrará una dosis de Td en torno a los 65 años a las personas que recibieron 5 dosis durante la infancia y la adolescencia.

Haemophilus Influenzae b

Hib = Haemophilus Influenzae tipo B

Hepatitis B

HB = Hepatitis B

- Vacunación a los 2, 4 y 11 meses siempre que se asegure una alta cobertura de cribado prenatal de la embarazada.
- Vacunación de hijos/as de madres con AgHBs positivo / aquellas no vacunadas sin cribado: a los 0, 2, 4 y 11 meses
- Primeras 24 horas de vida: 1 dosis + administración de inmunoglobulina anti-HB.
- Adolescentes y jóvenes no vacunados con anterioridad, **hasta los 18 años** se administrarán 3 dosis con pauta 0, 1 y 6 meses.

**Enfermedad
Neumocócica**

VNC = Vacuna Neumococo Conjugada / **VN** = Vacuna Neumocócica

- Vacunación en la infancia: a los 2 y 4 meses o a los 2, 4 y 6 meses, según la vacuna utilizada.
- Vacunación en mayores: a partir de los 65 años

Rotavirus

- Vacunación en lactantes a partir de la 6ª semana de vida
- Pauta según focha técnica
- Se debe incorporar en todas las CCAA antes de fin de 2025.

**Enfermedad
Meningocócica**

MenB = Antimeningocócica B

MenC = Antimeningocócica C conjugada

Men ACWY = Antimeningocócica para los serogrupos A, C, W e Y conjugada.

- MenB: 2 meses
- MenB + MenC: 4 y 12 meses
- MenACWY:
 - 12 años - 1 dosis a aquellos que no hayan recibido una dosis de MenACWY a partir de los 10 años de edad.
 - De 12 a 18 años: captación y vacunación de los adolescentes no vacunados hasta los 18 años.

**Sarampión,
Rubeola,
Parotiditis**

TV/SRP= Triple Vírica (Sarampión, Rubeola, Parotiditis)

- Recomendada en personas sin vacunación documentada nacidas en España a partir de 1978. Se administrarán 2 dosis de TV con un intervalo mínimo de 4 semanas entre dosis. En caso de haber recibido una dosis con anterioridad se administrará solo una dosis de TV.
- Está contraindicada la vacunación de embarazadas y personas inmunodeprimidas.

**Virus Papiloma
Humano**

VPH = Virus del Papiloma Humano

- 12 años - 1 dosis a niños y niñas.
- De 12 a 18 años: captación y vacunación de los adolescentes no vacunados hasta los 18 años. Pauta: 1 dosis.

Varicela**VAR=** Varicela

- Adolescentes que no hayan pasado la enfermedad y no se hayan vacunado: 2 dosis de VVZ separadas por 4 semanas entre dosis (preferiblemente 8 semanas) o completar la pauta si se ha recibido una dosis con anterioridad.
- Adultos (≥ 18 años) sin evidencia de inmunidad a la varicela* se realizará determinación serológica (IgG):
 - Serología negativa: 2 dosis, separadas por un intervalo mínimo de 4 semanas (preferiblemente 8).
- Contraindicada en embarazadas y personas inmunodeprimidas.

*Criterios de evidencia de inmunidad a la varicela en la población adulta:

1. Documentación de vacunación con dos dosis
2. Antecedentes de varicela o historia de herpes zóster
3. Confirmación serológica (IgG positiva)

Herpes Zóster**HZ=** Herpes Zóster

- Se recomienda la vacunación a partir de los 65 años. Pauta: 2 dosis separadas por 8 semanas entre ellas.

Gripe

- Prenatal: cada temporada se vacunará con 1 dosis a embarazadas (en cualquier trimestre de gestación) y durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).
- De 6 a 59 meses - 1 dosis en cada temporada.
- A partir de los 60 años - 1 dosis en cada temporada

Covid-19

- Prenatal: cada temporada se vacunará con 1 dosis a embarazadas (en cualquier trimestre de gestación) y durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).
- A partir de los 60 años - 1 dosis en cada temporada

Virus Respiratorio Sincitial**VRS =** Virus Respiratorio Sincitial

- Infancia de 0 a 6 meses:
 - Nacidos entre el 1 de abril del año de comienzo de la temporada y el 31 de marzo del año de fin de temporada: se recomienda la inmunización con 1 dosis.
 - Nacidos durante la temporada (de octubre a marzo) se recomienda la inmunización en las primeras 24-48 horas tras el nacimiento.

